

取扱説明書改訂のお知らせ

2025 年 6 月
日本イーライリリー株式会社

持続性 GLP-1 受容体作動薬
デュラグルチド(遺伝子組換え)注射液
トルリシティ®皮下注 0.75mg アテオス®
トルリシティ®皮下注 1.5mg アテオス®
TRULICITY® Subcutaneous Injections ATEOS®

生物由来製品
劇薬
処方箋医薬品^{注)}
注)注意－医師等の処方箋により使用すること

トルリシティ皮下注アテオスの取扱説明書を改訂しましたのでお知らせいたします。
改訂箇所につきまして、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

＜主な改訂内容＞

- 販売名に「トルリシティ皮下注 1.5mg アテオス」を追加しました。本文中の製品に関する記載は、トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス及びトルリシティ皮下注 1.5mg アテオスの共通の記載になるように「トルリシティ皮下注アテオス」に統一しました。
- 「ご使用方法」の「1.キャップを取り外す」の文字を大きくし、赤字に変更しました。
- 本剤の図をトルリシティ皮下注 0.75mg アテオス及びトルリシティ皮下注 1.5mg アテオスの共通の図になるように変更しました。
- 「本剤の情報提供サイト(患者様向け)」の URL 及び 2 次元コードを更新しました。

詳細は下記の新旧対照表を参照ください。
なお、今回の改訂による本剤の使用方法や操作方法に変更ありません。

＜新旧対照表＞

- 「トルリシティ皮下注 1.5mg アテオス」追加に伴う記載整備

[]: 変更箇所]

改訂前	改訂後
表紙 	表紙: トルリシティ皮下注 1.5mg アテオスを追加しました 
1 ページ: トルリシティ皮下注 0.75mg アテオスについて トルリシティ皮下注 0.75mg アテオスをご使用の前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。正しいご使用方法について主治医の指示に従ってください。 トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス(以下、本剤)	1 ページ: トルリシティ皮下注アテオスについて トルリシティ皮下注アテオスをご使用の前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。正しいご使用方法について主治医の指示に従ってください。 トルリシティ皮下注アテオス(以下、本剤)は 1 回使

改訂前	改訂後
は 1 回使い切りの注射剤です。本剤は 1 週間に 1 回の注射剤で、注入器には 1 回分の薬液があらかじめ充填され、注射針も装着されているので、そのままご使用いただけます。1 回で全量を使用します。	い切りの注射剤です。本剤は 1 週間に 1 回の注射剤で、注入器には 1 回分の薬液があらかじめ充填され、注射針も装着されているので、そのままご使用いただけます。1 回で全量を使用します。
11 ページ(裏表紙): 本剤の情報提供サイト(患者様向け) トルリシティ皮下注 0.75mg アテオスの注射や取扱いに関するその他の情報もご提供しております。	11 ページ(裏表紙): 本剤の情報提供サイト(患者様向け) トルリシティ皮下注アテオスの注射や取扱いに関するその他の情報もご提供しております。



2. 「ご使用方法」の「1.キャップを取り外す」の文字を大きくし、赤字に変更しました。

改訂前	改訂後
5 ページ: 	5 ページ: 「キャップを取り外す」の文字を大きくし、赤字に変更しました。 

3. 本剤図の変更

黄色ラベル部分を削除し、トルリシティ皮下注 0.75mg アテオスおよびトルリシティ皮下注 1.5mg アテオスの共通の図になるよう変更しました。

改訂前	改訂後
表紙: 	表紙: 本剤の図を差替えました。 

改訂前	改訂後
4 ページ:ご使用方法 	4 ページ:ご使用方法 本剤の図を差替えました。 
5 ページ: 1 キャップを取り外す 	5 ページ: 本剤の図を差替えました。 1 キャップを取り外す 
5～6 ページ: 2 底面を皮膚にあて、ロックを解除する  3 注入ボタンを押し、そのまま待つ 	5～6 ページ: 本剤の図を差替えました。 2 底面を皮膚にあて、ロックを解除する  3 注入ボタンを押し、そのまま待つ 

4. 「本剤の情報提供サイト(患者様向け)」の URL 及び 2 次元コードを更新しました。

改訂前	改訂後
11 ページ(裏表紙): 本剤の情報提供サイト(患者様向け) 本剤の情報提供サイト(患者様向け) トルリシティ皮下注0.75mgアテオスの注射や取扱いに関するその他の情報もご提供しております。 https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-trulicity 	11 ページ(裏表紙): 「本剤の情報提供サイト(患者様向け)」の URL 及び 2 次元コードを更新しました。 本剤の情報提供サイト(患者様向け) トルリシティ皮下注アテオスの注射や取扱いに関するその他の情報もご提供しております。 https://jp.lilly.com/diabetes_consumer/usage-trulicity 

本内容は、弊社医薬情報ホームページからもご覧いただけます。

製造販売元
日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通 5 丁目 1 番 28 号



医薬情報問合せ窓口(医療関係者向け)

TEL 0120-360-605 ※1

受付時間: 月曜日～金曜日 8 時 45 分～17 時 30 分※2

※1 通話料は無料です。携帯電話からでもご利用いただけます。尚、IP 電話からはフリーダイヤルをご利用できない場合があります。

※2 祝祭日及び当社休日を除きます。

医療関係者向けホームページ: <http://medical.lilly.com/jp>

®: 登録商標
TLC-N018(R0)
2025 年 6 月作成